

DESOGERME AGRICHOC

DESINFECTANT PODEROSO BACTERICIDA, FUNGICIDA Y VIRUCIDA



- **Espectro muy ancho, elimina bacterias, setas y virus.**
- **Profilaxia alta realización de las enfermedades contagiosas (Gripe aviar y porcina, virus aftoso ornithobacterium).**
- **Homologación del Ministerio de la Agricultura N ° 2020286.**
- **Muy económico: utilización global al 1 %**
- **Utilizable en agricultura biológica (Ecocert).**
- **Compatible con contacto alimentario.**
- **Thermonebulizable.**
- **Ligero perfume pino verde.**

CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS :

- Líquido verde claro y incoloro con olor conífera.
- Ininflamable.
- Densidad a 20°C: 1,03 ± 0,02.
- PH de la solución concentrada: 3,4 ± 0,5.
- PH de la solución diluida al 1%: 8 ± 0,5
- Soluble en toda proporción en el agua y los disolventes polares.
- Composición: cloruro de didecyl dimethyl amonio 35 g/L, Cloruro de alkyl dimethyl benzyl amonio 10 g/L, Formaldehyde 120 g/L y Glutaraldehyde 20 g/L.
- Exento de compuestos clorados, yodados y fenólicos y metales pesados.
- Compatible con los compuestos orgánicos catiónicos y no jónicos.
- Incompatibles con los compuestos aniónicos, los ácidos y las bases fuertes.
- Bactericida a espectro muy ancho: bacteria Gram + y Gram-, mycobactéries; fungicida; virucida.
- Conformar la norma AFNOR de desinfección, bactericida, fungicida y virucide NFT 72 301, 72 190, 72 180, 72 181 y a las **normas** europeas **EN 1276** y **1650**.
- Activo en presencia de agua dura y en presencia de materias proteicas.
- Irritación primaria cutánea al 5%: no irritante.
- Desogerme agrichoc es un biocida utilizado para el uso PT 03 (productos biocidas destinados a la higiene veterinaria) y PT 04 (desinfectantes para las superficies en contacto con los productos alimenticios y los alimentos para animales). Directiva biocida 98/8/CE: las sustancias activas utilizadas en la formulación son notificadas al anexo II.

SEGURIDAD / MEDIO AMBIENTE:

- Homologación N ° 2020286 por el Ministerio de la Agricultura.
- Consentimiento N°00416, profilaxia de las enfermedades contagiosas (como la fiebre aftosa).

- Esta preparación, diluida a la dosis máxima de utilización préscrite, no es objeto de ninguna clasificación según la directiva 1999 / 45 / CE.
- Corrosivo: puede provocar quemaduras. Contiene del formaldéhyde.
- El puerto de guantes, gafas y máscaras de protección es fuertemente recomendado.
- Nocivo por inhalación, contacto con la piel, la ingestión.
- Los componentes de DESOGERME AGRICHOC son sobre la lista de la Orden ministerial del 08/09/99, relativo a los productos de limpieza del material que pueden encontrarse en el contacto de productos alimenticios.
- Respetar las dosis de empleo.
- Evitar echar el producto concentrado en el medio ambiente.
- Hacer tratar el embalaje por un prestatario acreditado.

MODO DE UTILIZACIÓN:

- Tratamiento preliminar aconsejado: desinsectación, humedecimiento, desempolvar, limpieza de los locales, el enjuague al agua.
- Aplicar por aspersion, con máquina a presión (ATOMIST) o por remojo en cubas.
- Nebulización a frío (ATOMIST, ROTOFOG).

Dosis y usos:

- Bactericida en 5 min al 0,25 %, a 20°C. En presencia de albúmina bovina (0,3 g/L); fungicida en 15 min al 0,25 %, a 20°C. En presencia de albúmina bovina (0,3 g/L); Virucide en 30 min al 1 %, a 20°C. En presencia de albúmina bovina (0,3 g/L).
- Profilaxia de las enfermedades contagiosas: el 1 % en 30 min a 20°C.
- Thermonebulización (bactericida, fungicida) a 1,5 ml / m³, contacto 3 horas.
- Sometiendo a un test bactericida, fungicida, virucide al 0,25 %, contacto 2 horas.

DESOGERME AGRICHOC



Desinfectante poderoso para crianzas de animales Bactericida, Fungicida , Virucida

EFICACIA

- **Bactericida al 0.25%** : Salmonella, Pseudomonas, Staphylococcus, Enterococcus, E.Coli, Mycobacterium ...
- **Fungicida al 0.5%** : Hongos y levaduras (Candida, Aspergillus, Penicillium, Cladosporium ...)
- **Virucida al 0,25%** : Gripe aviar, Coronavirus, Parvovirus, Fiebre aftosa, Virus de Aujeszky, Gumboro, Talfan, Newcastle, Myxomatosis, Bacteriofagos, Hepatitis.
- Muy economico y no mutagenico (Mutatest de Ames)

DESOGERME AGRICHOC, garantiza a bajo costo, una perfecta hygiene de locales y materials, incluso en presencia de materias orgànicas interferentes.

DOSIS Y USOS

Desinfección de locales y materiales de crianza (durante el vacio sanitario), vehículos, locales de preparacion de comida, almacenes.

INSTRUCCIONES DE USO

- Durante el vacio sanitario: después de limpieza, lavado y desinsectización de los locales, implementos y vehículos, desinfectar por aspersión o remojo con DESOGERME AGRICHOC diluido del 0,125% al 1% en agua (1/800 a 1/100) con màquina de presión.
- Pediluvios y rodoluvios: repetir una vez por semana con DESOGERME AGRICHOC diluido al 1%.
- En termo-nebulización o nebulización en frío : nebulizar DESOGERME AGRICHOC a 1,5ml/m3.